



**Centre National de
Transfusion Sanguine**



Influence des facteurs extrahospitaliers sur la déclaration des AES: le rôle de la famille

**Résultats issus d'une enquête comportementale face aux Accidents
d'Exposition au Sang (AES) dans deux structures sanitaires de Zinder
NIGER**

Enquête conjointe CRTS/CRLS/ULSS/Solthis

**MAMAN AMINOUBRAH
CHARLOTTE DEZE
GREGOIRE LURTON**

Symposium Gérès - Décembre 2008





Centre National de
Transfusion Sanguine



Solthis
SOLIDARITE THERAPEUTIQUE
& INITIATIVES CONTRE LE SIDA



VIH/Sida et accès aux ARV au Niger


- Prévalence VIH/Sida au Niger: **0,7%**
(EDS 2006)
- Initiative Nigérienne d'Accès aux ARV (INAARV): mise en place depuis 2004
- INAARV à Zinder: depuis fin 2005



Objectifs de l'enquête initiale: Identifier les déterminants des AES...



...et les obstacles à la déclaration



Analyse complémentaire: Influence des facteurs extrahospitaliers sur la déclaration des AES, en particulier le rôle de la famille



**Centre National de
Transfusion Sanguine**



Solthis
SOLIDARITÉ THÉRAPEUTIQUE
& INITIATIVES CONTRE LE SIDA



Description de l'enquête

Enquête comportementale conduite en janvier 2008 évaluant les CAP (connaissances, attitudes, pratiques) des agents de santé exposés entre 2005 et 2008

Méthode: entretiens directifs comprenant 81 questions ouvertes à réponses spontanées (précodées pour les enquêteurs)

- Connaissances et attitudes (partie théorique) sur le VIH/Sida, les précautions universelles et les AES
- Pratiques (partie pratique) concernant les répondants ayant vécu au moins un AES

Echantillon: 106 (**52,75%**) sur 201 agents de santé de:

- l'Hôpital National de Zinder et
- Centre Régional de Transfusion Sanguine de Zinder


Critères d'inclusions:

- personnel titulaire ou contractuel des services de soins exposés aux AES
- ancienneté d'au moins 12 mois
- compréhension du français ou de l'haussa

100% d'acceptation de réponse à l'enquête

Composition:


- Sex ratio = 1,3
- 5% médecins
- 67% infirmiers
- 11% aides-soignants / manœuvres
- 17% techniciens de laboratoire



Prévalence d'AES chez les agents de santé exposés:


- Notre étude: **19,8%**
- Autres études en Afrique de l'Ouest (2001-04): **39,7 - 45,7%**

Proportion de déclarations: **33,3%**





A quelles étapes se situent les obstacles à la déclaration des AES...



Résultat principal: Malgré une bonne connaissance de la conduite à tenir chez 95% des répondants, 71% des victimes d'AES n'ont pas eu une conduite adéquate



Centre National de
Transfusion Sanguine



Solthis
SOLIDARITÉ THÉRAPEUTIQUE
& INITIATIVES CONTRE LE SIDA



Questions traitant directement des rapports à la famille:

- Question E04 'Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'en parler à vos proches?'
- Question E07 'Quelle est la raison majeure pour ne pas en parler à vos proches?'
- Question F12 'Avez-vous parlé à vos proches du ou des AES que vous avez eu(s)?'
- Question F13 'Pourquoi n'en avez-vous pas parlé à vos proches?'



Questions pour lesquelles le rapport à la famille peut être un élément de réponse:

- Question E09 'Pourquoi ne pas déclarer un AES?'
Risque de se savoir/méfiance parmi les proches
- Question F07 'Pourquoi n'avez-vous pas déclaré le ou les AES?'
Risque de se savoir/méfiance parmi les proches
- Question E20 'Quelle est la raison majeure pour laquelle vous n'accepteriez pas de prendre des médicaments?'
Risque de se savoir/méfiance parmi les proches



21 Victimes d'AES

21 Victimes d'AES			Pratique			
			Révélation à la famille		Non révélation à la famille	
			Déclaration	Non Déclaration	Déclaration	Non Déclaration
Théorie (attitudes)	Révélation à la famille	Déclaration	4	7	1	4
		Non déclaration		1		
	Non révélation à la famille	Déclaration			2	2
		Non déclaration				

La révélation (57%) est plus fréquente que la déclaration (33%)

Les personnes qui ont subi et révélé un AES continuent à penser qu'il est nécessaire d'informer sa famille d'un AES



		Révélation à la famille	Non révélation à la famille
Déclaration	AES	16	4
	Non AES	65	16
Non déclaration	AES	1	0
	Non AES	3	1

- L'intention de révélation n'influe pas sur l'intention de déclaration [(81/85) 95% vs (20/21) 95%]
- L'expérience d'un AES ne semble pas modifier:
 - o l'opinion sur la déclaration [95%(AES)/95%(non AES)]
 - o les intentions de déclaration à la famille [81%(AES) versus 84% (non AES)]



Centre National de
Transfusion Sanguine



Solthis
SOLIDARITE THERAPEUTIQUE
& INITIATIVES CONTRE LE SIDA



Opinions sur la non-déclaration des AES

5% (5/106) n'estiment pas nécessaire de déclarer un AES

Raisons avancées:

40% (2/5) auraient peur que la famille soit mise au courant

Dans la pratique, aucun n'a invoqué le facteur familial



Centre National de
Transfusion Sanguine



Solthis
SOLIDARITE THERAPEUTIQUE
& INITIATIVES CONTRE LE SIDA



Opinions sur la non-révélation à la famille

Parmi ceux qui pensent qu'il ne faut pas révéler l'AES à leur famille:

30% pensent que les proches vont les rejeter

25% ne souhaitent pas paniquer la famille

20% se méfient des indiscretions de la famille

15% pensent que l'AES fait partie du secret professionnel

10% estiment que ce n'est pas nécessaire

Aucun ne pense que les proches vont l'empêcher de travailler

Parmi ceux qui n'ont pas révélé l'AES à leur famille:

3 estiment que ce n'était pas nécessaire

2 n'ont pas de proches à qui en parler

1 la famille l'aurait interdit de continuer à travailler

1 craint les indiscretions de la famille

Aucun n'évoque que la famille l'aurait rejeté



Centre National de
Transfusion Sanguine



Solthis
SOLIDARITÉ THÉRAPEUTIQUE
& INITIATIVES CONTRE LE SIDA



Bilan

- La majorité des répondants se déclarent prêts à révéler l'AES à leur famille
- En pratique, la révélation est même plus fréquente que la déclaration
- A priori, les répondants qui ont subi un AES restent convaincus du fait qu'il faut en parler à la famille
- **Le facteur familial ne semble pas influencer sur la déclaration d'un AES**
- Notons en outre que le facteur familial ne semble pas influencer sur la prise de médicaments suite à un AES (aucun des répondants refusant de prendre des médicaments suite à un AES ne l'évoque)

Une étude complémentaire pourrait permettre d'affiner la perception des éléments extrahospitaliers et de ne pas les percevoir que comme des facteurs limitant la déclaration des AES



Eléments socio-anthropologiques

- Existence d'une séparation entre la sphère privée, lieu de la révélation et la sphère professionnelle, lieu de la déclaration
On retrouve cette séparation dans l'invocation du secret professionnel, du risque de paniquer pour la famille, et la non nécessité de la révélation, et dans les résultats quantitatifs de l'étude.
- D'une manière générale, les agents de santé travaillant dans le VIH/Sida parlent peu de leur vécu professionnel à leur famille. Celle-ci n'a qu'une vision subjective des risques encourus par l'agent de santé
- La peur de la révélation est en fait plus liée à ce que le test VIH initial de l'AES pourrait révéler et à ses conséquences, indépendamment du risque lié à l'AES (à relier à la « théorie sexuelle du SIDA »)



**Centre National de
Transfusion Sanguine**



Solthis
SOLIDARITE THERAPEUTIQUE
& INITIATIVES CONTRE LE SIDA



Remerciements

- Enquêteurs
- Agents de santé de l'HNZ et du CRTS
- Administrations de l'HNZ et du CRTS
- Coordination Régionale de Zinder de Lutte contre le Sida (CRLS)
(Mr M. Goundara)
- Direction du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)
(Dr R. Kabo)
- Comité Médical Technique de l'Initiative Nigérienne des ARV (INAARV)
(Prof. I. A. Touré)
- Unité de Lutte Sectorielle VIH/SIDA Ministère de la Santé (ULSS)
(Dr F. Djermakoye)
- Coordination Intersectorielle de Lutte contre le Sida (CISLS)
(Dr M. Idé)
- LASDEL (A. Moumouni)
- ONG Solidarité Thérapeutique et Initiatives contre le Sida (SOLTHIS)
- Institut Pasteur (Y. Madec)