16e ICASA ADDIS ABEBA ETHIOPIE 4-8 Décembre 2011

Offrir systématiquement le dépistage VIH en milieu de soin : une urgence de santé publique.

Expérience de 4 services des CHU de Conakry, Guinée

(Provider-initiated HIV Testing and Counselling: a public health emergency. Experience of Conakry University-Hospital)

R. VILAIN[1], G. CHOAKEN[2], F. LAMONTAGNE[1], G. LURTON[1], M. BARRY[3], A.A.S. DIALLO[4], L. LAHO[5], D. MANDIOU[6], E. PAPOT[1], M. CISSÉ[2], F. HUBER[1]

1. ONG Solthis, Guinée et France - 2. Service de Dermatologie, CHU Donka, Guinée - 3. Service des Maladies Infectieuses, CHU Donka
4. Service de Médecine Interne, CHU Donka - 5. Service de Neurologie, CHU Ignace Deen, Guinée - 6. Laboratoire, CHU Donka

Contexte

- Le dépistage à l'initiative du soignant chez tout patient consultant dans un établissement de soins est recommandé par l'OMS depuis 2004 dans les pays où l'épidémie VIH est généralisée (prévalence > 1%), ce qui est le cas de la Guinée (prévalence VIH estimée à 1,6%).
- Les pratiques et les résultats du dépistage ont été étudiés chez les patients hospitalisés dans les deux CHU de Conakry, représentant le sommet de la pyramide sanitaire.

Méthodologie

- Etude rétrospective à partir des dossiers médicaux et des registres de laboratoires.
- Population : tous les patients hospitalisés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010, dans quatre services des CHU Donka (Dermatologie, Maladies Infectieuses et Médecine Interne) et Ignace Deen (Neurologie).
- Les patients ont été classés selon l'existence ou non de signes évocateurs du VIH en se basant sur la classification clinique de l'OMS (signes pouvant classer du stade II à IV).
- Les politiques de dépistage encouragées par les chefs de service différaient selon les services : dépistage systématique recommandé en Dermatologie, dépistage diagnostique (en cas de signe évocateur) recommandé dans les autres services.

Résultats

Caractéristiques générales des patients

	Ensemble	VIH connu	VIH découvert
N	759	80	96
Age médian (années)	46	38	39
Durée médiane d'hospitalisation (j)	11	11	13,5
Décès au cours de l'hospitalisation	131 (17%)	32 (40%)	27 (28%)

Pratiques de dépistage

	Dermatologie	Mal. Infectieuses	Méd. Interne	Neurologie	Total
N	77	162	310	210	**759**
dont **VIH inconnu à l'admission**	73 (95%)	98 (60%)	299 (96%)	209 (99%)	**679 (89%)**
dont **Signes évocateurs de VIH (%)**	9 (12%)	62 (63%)	100 (33%)	17 (8%)	**188 (27%)**
Dépistés pour le VIH	35 (48%)	52 (53%)	62 (21%)	21 (10%)	**170 (25%)**
dont **VIH+**	8 (23%)	40 (77%)	43 (70%)	5 (24%)	**96 (56%)**



Dépistage des patients présentant des signes évocateurs de VIH

VIH+
VIH-
Non dépistés



Dépistage des patients sans signes évocateurs de VIH

VIH+
VIH-
Non dépistés

Discussion

- Les patients hospitalisés sans signes évocateurs de VIH sont peu dépistés (14%), sauf en Dermatologie (50%) où un dépistage est en théorie proposé systématiquement.
- Les patients avec signes évocateurs sont également insuffisamment dépistés (54%).
- Les taux de positivité très élevés des tests prescrits, aussi bien chez les patients avec signes évocateurs (83%) que chez ceux sans signes évocateurs de VIH (19%) plaident pourtant pour un élargissement de l'offre de dépistage
- En effet, les données suffisent pour conclure que le taux de positivité des patients hospitalisés, bien que non connu avec précision puisque tous les patients n'ont pas été dépistés, est très élevé, et sans commune mesure avec la prévalence dans la population générale.

Conclusion

- Les résultats de cette étude plaident pour une meilleure application de la recommandation de l'OMS du dépistage à l'initiative du soignant, qui est encore peu suivie en dehors de populations particulières comme les femmes enceintes , les patients tuberculeux ou les enfants malnutris
- Une application progressive de la consigne de l'OMS de proposer le dépistage à tout patient fréquentant un centre de santé pourrait débuter par la recommandation de proposer systématiquement le dépistage à tout patient hospitalisé dans une unité de médecine ; ceci a bien entendu des implications en termes d'approvisionnement en tests de dépistage et en formation du personnel soignant.

Solthis
SOLIDARITÉ THÉRAPEUTIQUE & INITIATIVES CONTRE LE SIDA

Contact :
Dr Franck Lamontagne
Coordinateur médical, Solthis
Email : franck.lamontagne@solthis.org

ONG Solthis Guinée
Quartier Dixinn Port III, Corniche Nord
BP 6699 Conakry
GUINÉE

ONG Solthis
58A rue du Dessous des Berges
75013 Paris - FRANCE
Email : contact@solthis.org
www.solthis.org